

Tropfschema: Skiaskopie / Fundusuntersuchung

	Mydriaticum Agepha Tropicamid 0,5%	Mischtropfen Tropicamid 0,5% Phenylephrin 2,5%	Cyclopentolat 0,5%	Cyclopentolat 1%	Homatropin 2%	Atropin 0,5%	Atropin 1%
						Bei speziellen Indikationen: z.B. : Akkommodatio nsspasmus	Bei speziellen Indikationen: z.B. : Akkommodatio nsspasmus
Alter	Skia: 0-12 Monate Fd: jedes Alter	Fd: jedes Alter	Skia: 12 Mo – 6 Jahre	Skia: ab 6 Jahren	Skia: ab 12 Mo	Skia: 12 Mo - 30 Mo	Skia: ab 30 Mo
Tropfen	2x (10 min.Abstand)	2x (10 min. Abstand)	12 Mo – 24 Mo 1x. 24 Mo – 6 Jahre 2x (10 min. Abstand)	2x (10 min. Abstand)	2x (10 min.Abstand)	2x (5 – 10 min. Abstand)	2x (5 – 10 min. Abstand)
Untersuchung	20 min. nach 1. Tropfen	20 min. nach 1. Tropfen	40 min. nach 1. Tropfen	40 min. nach 1. Tropfen	50 min. nach 1 Tropfen	90 min. nach 1. Tropfen	90 min. nach 1. Tropfen
Kontraindikation	Engwinkelglaukom	Engwinkelglaukom, Schwangerschaft	Engwinkelglaukom, zerebrale Schädigung, Down-Syndrom, spastische Lähmung, Fieber	Engwinkelglaukom, zerebrale Schädigung, Down-Syndrom, spastische Lähmung, Fieber	Engwinkel- glaukom	Engwinkel- glaukom	Engwinkel- glaukom
Nebenwirkung	Tachycardie, Hyperthermie	Tachycardie, Hypertension	Tachycardie, Hyperthermie, psychotische Reaktionen, Krampfanfälle	Tachycardie, Hyperthermie, psychotische Reaktionen, Krampfanfälle	Tachycardie, Hypertension, Gesichtsrötung, Ataxie, Unruhe	Tachycardie, Hyperthermie, Krampfanfälle	Tachycardie, Hyperthermie, Krampfanfälle

Antidot : Bei Intoxikation mit anticholinergen Substanzen Physostigmin (=Anticholium) langsam i.v. oder Kurzinfusion (durch Kinderarzt oder Anästhesisten)
bei Hyperthermie: Eisbeutel, kalte Bäder